



भारत - केन्द्रीय खारा जलजीव पालन अनुसंधान संस्थान
ICAR - CENTRAL INSTITUTE OF BRACKISHWATER AQUACULTURE

ANNUAL REPORT 2016-17



Farm reared Hilsa shad, *Tenualosa ilisha*, at Kakdwip Research Centre of CIBA, West Bengal

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

जलजीव पालन एक आशाजनक क्षेत्र बन गया है जो विश्व के खाद्य उत्पादन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास जलजीव पालन जसि पर डीगा पालन का वर्चस्व है, भारतीय जलजीव पालन का प्रमुख आधार है। आईसीएआर-सीबा सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में पालन प्रणाली से अंतिम उपज अवस्था : जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं, पशु पोषण, स्वास्थ एवं आनुवंशिकी तक अनुसंधान एवं विकास कार्य करता है। हमारा ध्यान नरितर प्रजातियों में सुधार एवं परिष्कृत करने में योगदान देने की ओर है, जो प्रजातियों उत्पादन अवस्था में है और नई प्रजातियों के विकास में अनुसंधान अंतराल कम करना है।

हलिसा तैन्गुलोसा इलीशा का बंद स्थितियों में संवर्धन एवं प्रजनन

तैन्गुलोसा इलीशा जसि सामान्य तः हलिसा कहलाता है, दक्षिण एशिया विशिष्ट पश्चिम बंगाल में एक अति महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजाति है। बाजार की उच्च, मांग के कारण वनिकहीन शोषण तथा अन्यायमान वनिकहीन दबावों के कारण जलीय परितंत्रों में इस प्रजाति की उपज घटने लगी है। यद्यपि बंद प्रजनन का प्रयास वर्ष 1990 से किया गया है परन्तु जीवन चक्र का सफल समापन अभी भी गृह रहा है। काकद्वीप अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने वन्या रूप से प्राप्त प्रजनकों के उपयोग से हलिसा मछली का बंध नषिचन का मानकीकरण किया। प्रजनकों के विकास के लिए मुरींगा, पश्चिम बंगाल

से प्राप्त हलिसा पोनों का संवर्धन काकद्वीप अनुसंधान केन्द्र में मट्टी के खाराजलीय तालाब में किया गया। हलिसा मछली की पोने (1.37 ग्रा., 52.97 मि.मी.) 32 माह के संवर्धन काल में बढ़कर 383.80 ग्रा./339.33 (शारीरिक भार एवं कुल लम्बाई) की हो गई है। भारी संख्या में परिष्कृत नर मछलियों (139.35 ग्रा./260 मि.मी.) के साथ अंडाणु परिष्कृतता की 5वीं अवस्था की अंडाणुओं (570 मैक्रोमीटर) वाली परिष्कृत मादा मछलियाँ (358.18 ग्रा.-425.2 ग्रा./352 मि.मी.-370 मि.मी.) प्राप्त हुई हैं। नवम्बर से फरवरी के दौरान परिष्कृत नर एवं मादा मछलियों का अध्ययन किया गया जसिसे बंद स्थितियों में परिष्कृतता और बीज उत्पादन के लिए प्रजनन की संभावना स्पष्ट हुई है। खाराजलीय तालाब की बंद स्थितियों में प्रजनकों की यह पहली सूचना है।

आईसीएआर-सीबा बंद स्थितियों में मलिकभाषि प्रजनन की सफलता से आगे बढ़कर मलिकभाषि हैवरी हेतु प्रौद्योगिकी परीक्षण की ओर

बंद स्थितियों में मलिकभाषि प्रजनन प्रौद्योगिकी के परीक्षण से वर्ष 2016-17 के दौरान 2,12,500 लाख अंडों का उत्पादन हुआ। कुल उत्पादन की ज़िरे 54% नषिचन की दर से 1,15,000 है। लार्वा अतजीवता दर 45.5% प्राप्त किया गया है। बीजों को देश के विभिन्न खास जलीय पालन प्रणालियों में जलजीव पालन हेतु पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु के किसानों में वितरित किया गया। संभावित उद्यमियों के लिए घेरलूकृत मत्स्य संपदा के सृजन

के लिए 200 मछलियों का एक बूडबैक का रखरखाव किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बंद स्थितियों में मलिकभाषि के प्रजनन के प्रथम बैच को 'डेकन हलिसा' के नाम से प्राप्त किया गया। श्री अमलेश चटर्जी, एसी फिश एगुडा प्रोन फार्मस से भागीदारी के अंतर्गत किए गए पालन परीक्षणों में उत्पादन लागत 90-100 रुपए प्रति किलोग्राम और स्थानीय बाजार दर 150-170 रुपए प्रति किलोग्राम पाया गया।

देश के खाराजलीय किसानों के लिए आईसीएआर-सीबा के पश्चिम बंगाल का एशियन सीबास बीज उत्पादन में दो दशक

पछिले दो दशकों की कटबद्धता को जारी रखते हुए चालू वर्ष में भी आईसीएआर-सीबा देशभर के किसानों के लिए वीएनएन फ्री सप्लाय के माध्यम से लगभग 0.9 मिलियन एशियन सीबास बीजों की आपूर्ति की गई। संस्थान ने आंध्र प्रदेश के मछलीपटनम जिले में अल्पकालिक सीबास नर्सरी उत्पादन प्रणाली के उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संवर्धन गतिविधि वाली यह एक मॉडल सेटलाइट नर्सरी बन गई है जो देश के विभिन्न भागों में मछली पालन के लिए अंगुलिकाओं की आपूर्ति करती है। यह नर्सरी सीमांत ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका सृजन तथा खुले जल संसाधनों के उपयोग में भी एक मॉडल जैसा कार्य कर रही है।

फार्म आधारित प्रजनन प्रणाली में प्रति प्रजनन द्वारा ग्रे मुल्लेट का लार्वा उत्पादन

एक नजी उद्यमी के प्रकृति



स्थगल पर गये मुल्लोट प्रजनन के लिए प्रकृष्टेतर आधारित लो-वॉल्यूम ससिस्टम का विकास किया गया। इस प्रणाली के उपयोग से कए गए 8 एवं 5 प्रजनन परीक्षण के परिणामों में अंतिम अंडाणु परपिक्वता तथा अंडोत्सर्जन देखा गया एवं क्रमशः 750-850 μm प्राप्त किया गया। प्रेरति प्रजनन के माध्यम से प्रतीमा से लगभग 0.5 मिलियन अंडे प्राप्त हुए तथापि, नषिचन दर सापेक्ष रूप से कम रही। इस प्रणाली से लाखा उत्पादन इस मॉडल की संभाव्यता सूचित करता है।

ग्रे मुल्लोट की बंद स्थितियों में परपिक्वता एवं नषिचन

चालू वर्ष में ग्रे मुल्लोट का प्रेरति नषिचन सफलतापूर्वक किया गया। तीन मछलियों में प्रेरति नषिचन देखा गया जिनसे इंद्रा ऑवारीन अंडाणु व्यास 520, 525 तथा 535 μm प्राप्त हुआ। LHRHa तथा डोपामाइन इनहेबिटर के संयोजन की प्रतिक्रिया स्वःरूप मछलियों में नषिचन संपन्न हुआ। 2 मिलियन से अधिक अंडे प्राप्त हुए जिनका व्यास 800 μm है। तथापि, नषिचन दर कम देखी गई। उष्मा यन टैंक से एकत्रित लाखा का औसत आमाप 2.4 म.मी. (टीएल) है।

लजि पार्सिया में लैंगिक परपिक्वता तथा प्रेरति प्रजनन के लिए पीयूष ग्रंथी सार अनुकूलतम पाया गया

लजि पार्सिया के लिए केवल पीयूष ग्रंथी सार या hCG के संयोजन आशाजनक सुराक पाई गई और इससे अंडाणु व्यास, अंडोत्सर्जन का प्रेरण तथा नषिचन में उत्प्रेवखनीय वृद्धि हुई है। लजि पार्सिया में हार्मोन आपूर्ति के लिए ऑस्मोटिक पंपों का उपयोग पर कए गए अध्ययन में पाया गया कि लजि पार्सिया की लैंगिक परपिक्वता के लिए पीयूष ग्रंथी सार काफी प्रभावकारी है।

माइस्टस गुलियों के लिए छोटे पैमाने पर हैचरी प्रणाली के विकास के लिए

प्रोटोकॉल का अनुकूलन

माइस्टस गुलियों के हैचरी उत्पादन के लिए लागत प्रभावी सरल प्रोटोकॉल का विकास किया गया। प्रेरति नषिचन के लिए आपूर्ति की जाने वाली hCG सुराक का अनुकूलन किया गया। इसके अलावा, यह पाया गया कि नर पक्षपाती लिंगानुपात प्रजनन उपज को बढ़ाता है। सफल नषिचन के लिए अंडाणु का व्यास 750- 850 μm होने पर hCG का प्राइमरी एवं सेकेंडरी डोज की आवश्यकता होती है जबकि अंडाणु का व्यास 850 μm होने पर hCG का एक डोज आवश्यक होता है।

बंद स्थितियों में प्रजनन संपदा के विकास के माध्यम से रेड स्नैप पर के बंद प्रजनन हेतु ठोस नींव

घरेलूकृत तालाब तथा आरसीसी टैंक आधारित प्रजनन संपदा के विकास के माध्यम से रेड स्नैप पर तुटजानस अर्जेंटमिक्यू लेटर के बंद प्रजनन हेतु ठोस नींव रखी गई है। तालाब आधारित पालन परीक्षणों से सूचित होता है कि तालाब आधारित प्रणाली में ट्रेिश फिश तथा गोलीनुमा आहार के उपयोग द्वारा आहार रणनीति अपनाने पर बेहतर वृद्धि देखी गई। परिणामों से यह भी सूचित हुआ है कि 10 माह की पालन अवधि में औसत शारीरिक भार में 865 ग्राम की वृद्धि की संभावना है।

जड़ खाद्य पदार्थों को प्रारंभिक आहार के रूप में उपयोग से प्रल संप्रोथट लाखा संवर्धन की संभावनाओं का नरूपण

प्रल संप्रोथट के लाखा संवर्धन प्रोटोकॉल के परिशोधन हेतु कए गए प्रयोगों में प्रारंभिक आहार के रूप में जड़ खाद्य पदार्थों पर प्रल संप्रोथट के संवर्धन की क्षमता देखी गई है। 100 माइक्रोन की एक प्रारंभिक आहार से 200 और 300 माइक्रोन की अपेक्षा काफी अधिक वृद्धि दर प्राप्ति हुई। 15 दिनों के संवर्धन काल केवल जड़ आहारों के उपयोग की तुलना में जड़ आहार

के उपयोग के दौरान सूक्ष्म शैवाल पृष्ठभूमि में उपयोग करने पर बेहतर वृद्धि दर (अंतिम औसत शारीरिक भार 13.48 ± 1.47 म.ग्र.) देखी गई। प्रल संप्रोथट के टैंक आधारित नर्सरी संवर्धन प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि प्रल संप्रोथट नर्सरी संवर्धन के लिए संग्रहण घनत्व 1.5 नग प्रति लीटर तथा 15 पीपीटी लवणीयता अनुकूल है।

वलिपुत्सप्राय प्रजाति कनारा प्रल संप्रोथट इट्रोपललास कनारेंसिस के संरक्षण में एक उत्प्रेवखनीय कदम है : आईसीएआर-सीबा द्वारा बंद प्रजनन का मानकीकरण

कनाराट से प्राप्त कनारा प्रल संप्रोथट (100 नग औसत लंबाई 88.9 ± 8.9 म.मी.; औसत भार 18.26 ± 6.79 ग्र.) मछलियों को हैचरी स्थितियों (लवणीयता : 5-8 पीपीटी, तापमान 26-28°C, पीएच-7.5-8.2) के अनुकूलन से पांच परीक्षणों में सफलतापूर्वक प्रजनन करवाया गया। लाखा की औसत संख्या 75-100 प्रति नषिचन दर्ज किया गया। घरेलूकृत प्रजनन संपदा के विकास के लिए मत्स्य हैचरी में एफ-1 पीढ़ी के 300 जीर्णों का रखरखाव किया जा रहा है।

खाराजलीय परितंत्र में जलजीव पालन के व्यवहार्य विकल्प के रूप में इटीग्रेटेड मल्टीक-ट्रॉफिक एक्वाकल्चमर (आईएमटीए) का परीक्षण

चार भिन्न प्रजाति संयोजनों : टायगर शरमिप (पीनीयस मोनोडॉन) + मुल्लेट्स (मुगलि सेफालस तथा लजि टेड) – (सी), टायगर शरमिप + मुल्लेट्स + वाटर स्पैनेक (इपोमोइया एक्वाफटिका) (टी-1), टायगर शरमिप + मुल्लेट्स + आयस्टोनर (क्रासोस्ट्रिया कटकेनसिस) – (टी-2), टायगर शरमिप + मुल्लेट्स + वाटर स्पैनेक + आयस्टोनर – (टी-3) का 150 दिनों तक 12 तालाबों (500 वर्गमीटर) में आईएमटीए मूल्यांकन किया गया। अन्य उपचारों की अपेक्षा

दोनों पौधों का मछली एवं डींगे के संयोजन में नकिसी फसलों के रूप में उपयोग सं उल्लेखनीय उत्पन्न उत्पादन (1510±36 क.ग्र./हे.), बेहतर जल गुणवत्ता, उच्च- लाभ:लागत अनुपात के साथ उत्पन्न आय (रू.2.24 लाख/हे.) प्राप्त किया गया।

इंडियन व्हाइट श्रमिप पीनयिस इंडकिस के पालन का नरूपण

वभिन्नव कृषि जलवायु क्षेत्रों में इंडियन व्हाइट श्रमिप पीनयिस इंडकिस की उत्पादन क्षमता के मूल्यांकन हेतु भारत के 6 भिन्न तटीय राज्यों में पायलेट स्कूल पर पालन कर नरूपण कार्य किया गया। इन परीक्षणों में 2 से 12 पीपीटी लवणीयता एवं 35 पीएल/वर्ग मीटर के संग्रहण घनत्व पर औसत उत्पादन 4.4 ± 0.8 मटिरिक टन/हे. तथा 10 पीएल/वर्ग मीटर संग्रहण घनत्व पर 1.142 ± 0.20 टन/हे. प्राप्त किया गया। 135 दिनों की पालन अवधि के पश्चात् नमिनस एवं उच्च। संग्रहण घनत्व पर अंतिम शारीरिक भार क्रमशः 28-30 ग्र. तथा 17-20 ग्र. पाया गया।

टाइगर श्रमिप पी. मोनोडोन, पेसफिक व्हाइट श्रमिप पी. वननामई तथा इंडियन व्हाइट श्रमिप पी. इंडकिस के उत्पादन गुण

टाइगर श्रमिप पी. मोनोडोन, पेसफिक व्हाइट श्रमिप पी. वननामई तथा इंडियन व्हाइट श्रमिप पी. इंडकिस के उत्पादन गुणों की तुलना के लिए काकद्वीप अनुसंधान केन्द्र के प्रक्षेत्र स्टेशन में 120 दिनों का प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया। 14 सप्ताह की पालन अवधि के दौरान पी. इंडकिस की वृद्धि का स्वरूप पी. वननामई के समान ही रहा और इससे यह सूचित होता है कि इस प्रजाति को घरेलूकृत फसल के रूप में विकास की संभावनाएं हैं।

आहार की उच्च बारंबारता के दौर में पीनयिस इंडकिस के लिए उच्च

घनत्व एवं स्वीच्य जल वाले नर्सरी संवर्धन

हैचरी उत्पादन एवं पालन अवस्था के बीच नर्सरी संवर्धन के अनेक लाभ जैसे बढ़ती वृद्धि, नमिनस एफसीआर, पालन की छोटी अवधि तथा रोगाणुओं के संक्रमण का कम प्रकोप आदि हैं। इस संदर्भ में पीनयिस इंडकिस के लिए उत्ती घनत्व वाले नर्सरी संवर्धन प्रोटोकॉल का विकास किया गया। इस अध्ययन से यह नरूपित किया गया कि तारवा के बाद की अवस्था के डींगों को 1000 नग/घन मीटर की दर से 45 दिनों तक नमिनस प्रोटीन वाले आहार (30%) तथा अंतिम शारीरिक भार एवं अतजीवता से समझौता करे बिना संवर्धन किया जा सकता है।

भारत के आंध्र प्रदेश वसिला में कुरुमा श्रमिप पीनयिस जापोनकिस के पालन का नरूपण

कुरुमा श्रमिप पी. जापोनकिस अधिकतम मूल्य का पालन डींग है और इसे जापान में समुद्री खाद्य उत्पादन का राजा कहा जाता है। चूंकि डींग लंबी दूरी के परिवहन को सह सकता है, अतः इस प्रजाति को जीवित अवस्था में वक्रीय किया जा सकता है जिससे अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इस पृष्ठीभूमि के वपिरीत इस प्रजाति को विविधित फसल के रूप में विकास करने की संभावनाओं को नरूपित करने हेतु किसान के तालाब में पालन प्रयोग करे गए। नीचे की रेतीली सतह वाले 600 वर्ग मीटर वाले तालाब में 50 नग प्रति वर्ग मीटर के संग्रहण घनत्व से करे गए पालन से 150 दिनों में 5000 क.ग्र./हे. तथा 50 प्रतिशत अतजीवता दर प्राप्त हुई।

कुरुमा डींग पीनयिस जापोनकिस का नमिन लवणीय नरूपण

समुद्री जल तथा समुद्री जल के समान लवणीयता स्तर में पी. जापोनकिस पालन का सफल प्रलेखन किया गया। पूर्व में

करे गए अनुसंधान परिणामों के वपिरीत 60 दिनों के इंडोर प्रयोग से नरूपित होता है कि पी. जापोनकिस को नमिन लवणीयता दर 5-10 पीपीटी पर, वृद्धि एवं अतजीवता दर से समझौता करे बिना पालन किया जा सकता है।

तरुण डींगों की बेहतर अतजीवता तथा आमप में सुधार के लिए मड क्रेब नर्सरी में आवधिक आकार का ग्रेडिंग

नर्सरी संवर्धन के दौरान मड क्रेब का सामाजिक पदानुक्रम एवं आक्रमकता, पशु के आमप से संबंधित एक गुण है जो नरभक्षिता, क्षेत्रीय व्यवहार तथा प्रतिबंधित आहार का कारण बनता है और इसके परिणामस्वरूप उपज के दौरान आमप की वविधिता तथा नमिन स्तर की अतजीवता प्राप्त होती है। मड क्रेब की आक्रमकता के आमप ग्रेडिंग का वृद्धि एवं तरुण डींगों की अतजीवता पर प्रभाव के अध्ययन के लिए नर्सरी संवर्धन प्रयोग किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवधिक आमप ग्रेडिंग के अंतर्गत संवर्धित केकड़ों में उच्च अतजीवता दर होती है, तथापि औसत में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं पाया गया।

स्काउडला सरया की अतजीवता एवं वृद्धि पर लवणीयता का प्रभाव

मड क्रेब एस. सरया की वृद्धि एवं अतजीवता के लिए अनुकूलतम लवणता स्तर का निर्धारण किया गया। लवणीयता के चार स्तरों, 5, 15, 25 और 35%, का मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन चार लवणीयताओं में उच्चतम अतजीवता (93.3%) 35% में पायी गयी और इसके बाद का स्थान 25% (63%), 15% (46.7%) तथा 5% (40%) रहा है। तथापि नमिन लवणीयता स्तर में अंतिम शारीरिक भार तथा पृष्ठवर्ग (कारापेस) की चौड़ाई परीक्षण उत्तम लवणीयता से तुलना योग्य है। यद्यपि 35% पर अतजीवता अधिक है, इस लवणीयता में वशिष्ट वृद्धि अधिक



नहीं है, अतः बेहतर वृद्धि एवं अतृप्तिवर्तिता के लिए 15 से 25% लवणीयता की संसृति दी जा सकती है।

वाणज्यिक परीक्षणों में पीनयिस इंडीक्स की प्रजनन क्षमता

घरेलूकरण एवं अनुवांशिक सुधार के लिए स्थासनीय देशज सम्पादाओं को प्रमोट करने में वन्य इंडियन व्हाइट श्रमिण्य के प्रजनन तथा बीज उत्पादन की अंतरनिहित क्षमता/अवरोधों का प्रत्येक महत्वपूर्ण कारक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न स्थानों से प्राप्त वन्य प्रजनकों का प्रजनन क्षमता एवं हैचरी उत्पादन का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त डब्ल्यू एसएसवी प्रकोप का भी मूल्यांकन किया गया। बंद स्थितियों में संसृति की असफलता तथा मैचुरेशन टैकों में नर मछलियों का नमिन् संख्याल से नषिवन पर प्रतिकूल पड़ता है। औसत सफल चक्र में नौप्लीयस से माइसिस अतृप्तिवर्तिता 60% (50%-70%) जब कि माइसिस से पीएल 25% प्राप्त की गई। डब्ल्यू एसएसवी संक्रमण से संपकष्ट हुआ है कि पी. इंडीक्स प्रजनकों में मासिक औसत प्रकोप 72% है और अत्यधिक प्रकोप अगस्त से नवम्बर के दौरान (87.5-100%) है।

पीनयिस इंडीक्स के लिए बीज परिवहन प्रोटोकॉल का मानकीकरण

लम्बीस दूरी तक पीएल के परिवहन से जुड़ी बड़ी समस्या दबाव के कारण मास्यकता है। फार्म में पहुंचने तक पी. इंडीक्स के बीज परिवहन का मानकीकरण पीएल की उत्त अतृप्तिवर्तिता दर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन से सूचित होता है कि पीएल 9 अवस्थास वाली पी. इंडीक्स लम्बी दूरी के परिवहन के लिए उपयुक्त है तथा उन्नत पीएल के मामले में संग्रहण घनत्व 250 नग/ली. से कम रखा जा सकता है।

पीनयिस जपोनीकस का बीज

उत्पादन एवं लार्वा संवर्धन

भारत में पेनेयड झींगा पालन में विविधता लाने की दृष्टि में प्रथम कदम के रूप में पीनयिस जपोनीकस के बीज उत्पादन का परीक्षण किया गया। वन्य रूप से प्राप्त पी. जपोनीकस के प्रजनकों के उपयोग से नषिवन और लार्वा संवर्धन परीक्षण किए गए। लार्वा अवस्थास पूर्ण होने के पश्चात उपरोक्ता लार्वा संवर्धन पद्धति से औसत अतृप्तिवर्तिता 50% और उत्तजतम अतृप्तिवर्तिता 90% प्राप्त की गई। दो साइकल से कुल 2 लाख लार्वा का उत्पादन किया गया और पीएल 20 की अवस्था में किसानों के तालाबों तक पालन संबंधी अध्ययनों के लिए भेजा गया।

मड क्रैब सूका इला सरसा की तृण मछलियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु द्विविणीय प्रणाली

इस प्रजाति के हैचरी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सूका इला सरसा के संवर्धन तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधी प्रयोग किए गए। द्विविणीय प्रणाली में इनडोर एफआरपी टैंक में जेड। लार्वा को मेघालोपा अवस्था तक तथा मेघालोपा अवस्था से आगे मट्टी के तालाबों में स्थानपति आउटडोर नेट केज में पालन किया गया। इसके बाद बड़े टैंकों में उत्त घनत्व (> 150 नग/ली.) तथा छोटे टैंक में नमिन् संग्रहण घनत्व (10 नग/ली.) का मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि इन्डोर हैचरी में मेघालोपा अवस्था तक हैचरी उत्पादन के बाद बंद कर देना उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के दृष्टि में कुशल पद्धति है। यद्यपि छोटे टैंकों का उत्पादन अधिक है, बड़े टैंकों में उत्त घनत्व अपना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

मेघालोपा अवस्थान से बाहरी संवर्धन के माध्यम से मड क्रैब बीज उत्पादन में हैचरी फेज को घटाना

केकड़ा लार्वा जीवन चक्र में मेघालोपा अवस्था मड क्रैब बीज उत्पादन में

संवेदनशील अवस्था है चूंकि इसके मांसभक्षी आवरण, आहार पद्धति में बदलाव तथा क्रमिक अवस्थावपन के कारण इन्डोर टैंकों में उत्त आ मास्यकता दर होती है। मेघालोपा को वैकल्पिक रूप से खाराजतीय तालाबों में स्थपित नेट केज में संवर्धन किया जा सकता है और यह मड क्रैब की हैचरी अवस्था की अवधि को उत्तस्वनीय रूप से कम कर देता है। इन्डोर हैचरी से मेघालोपा को निकालने की आयु का मूल्यांकन एक 15 दिवसीय प्रयोग में किया गया। 3 और 4 दिनि आयु वाले मेघालोपा के उपयोग से मेघालोपा से केकड़े में बदलने का बेहतर बदलाव दर क्रमशः 62.33 ± 3.08% तथा 69.66 ± 2.35% प्राप्त किया गया। वर्तमान परीक्षणों से यह नषिक रूप नकिलता है कि 3 से 4 दिनि आयु वाले मेघालोपा को आउटडोर सस्टिषम में संग्रहित करना बेहतर परिणाम देता है और इस जीवन अवस्था में मत्स्य कपालकों को केकड़ा पालन हेतु आपूर्ति की जा सकती है।

झींगा प्रक्षेत्रों में रोग निगरानी

वर्ष 2016-17 के दौरान 155 झींगा प्रक्षेत्रों का अधुयन किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान भी माइक्रोस्पो। रोडियन परजीवी एन्टे रोसाइटोजून हेपाटोपेनेय (ईएवीपी) खारा जलजीव पालन के लिए बार बार संक्रमण उत्पन्न। किया। सफेद धब्बे रोग 8.9%, हेपाटोपैनक्रियाटिक माइक्रोस्पो रडोसिस 23.6% तथा संक्रमक हाइपोडर्मल एवं हेमाटोपोएटिक नेक्रोसिस (आईएचएचएन) 1.3%, मौजूद रहा है। प्रक्षेत्र के खराब प्रबंधन के कारण अन्य रोगों के लक्षण जैसे वृद्धि अवरोध, सफेद मल सडिरोम (डब्ल्यू एफएस), व्हाइट मल सडिरोम (डब्ल्यू एमएस), क्रोनिक मोस्टाल्टी सडिरोम तथा ब्लैक गलि सडिरोम क्रमशः 15.17%, 16.5%, 3.4%, 2.7%, 7.5% प्रक्षेत्रों में देखा गया है। अध्ययन से यह पुष्टि हुई है कि भारतीय खारा

जलजीव पालन ओआईई सूचीबद्ध रोगों से मुक्त है जैसे टौरासडिरोम (टीएस), येलो हेड रोग (वाईएचडी), एक्स्ट्रेट हेपाटोपैनक्रियाटिक नेक्रोसिस रोग (एचपीएनडी) तथा नेक्रोटैजिनि हेपाटोपैनक्रियाटाइटिस (एनएचपी)। फरवरी-मार्च, 2017 के दौरान पूरव गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश में ओआईई प्रोटोकॉल के उपयोग से पी. वन्यायमेय के दो प्रक्षेपणों 55 एवं 70 डीओसी के संक्रामक मयोनैक्रोसिस रोग की पहचान की गई। प्रभावित तालाबों में मारतृता दर लगभग 15% रही है। प्रभावित डीगों में व्हाटटशि एडोमिनिल मसल के साथ सुस्ती, मांसपेशियों में खिंचाव तथा आंतड़ियों में कमजोर एफसीआर 2.2, धीमी वृद्धि (70 डीओसी पर 4-5 ग्र.) होती है। जलजीव पालन की विधिकरण योजना के एक भाग के रूप में तमलिनाडु और ओडिशा के विभिन्न स्थातनों से प्राप्त पीनयिस इंडकिस प्रजनकों के रोगाणुओं का प्रोफाइलिंग किया गया ताकि सीबा हैचरी में प्रजनन कार्यक्रम में इनकी उपयुक्तता परखा जा सके। पीनयिस इंडकिस प्रजनकों 284 में से 72% डब्यूता एसएसवी से, 3.87% आईएचएचएनवी से प्रभावित है जिससे सूचित होता है कि हमारे खास जलीय परितंत्रों में इन रोगाणुओं की उच्च स्थूलनिकता है। पखमीन रोगों में से आईरोडोसे दोहरा संक्रमण (आरएसआईवीडी) तथा वायरल नर्वस नेक्रोसिस (वीएनएन) प्रक्षेपण एवं वन्यज पखमीनों जैसे सीबास, मत्ले ट, रेड स्नेसपर तथा तलापिया में आम है।

ईएचपी का प्रसार

ईएचपी के प्रसार पर किए गए अन्वेषणों से सूचित हुआ है कि संक्रमित डीगों के साथ दो सप्ताह के सहजीवन और ईएचपी से प्रभावित डीगों से हेपाटोपैनक्रियास के साथ सात दिनों तक आहार ग्रहण करने पर स्वस्थ एचपीएफ वन्योमेय डीगों में भी संक्रमण फैल सकता है। एक

और रोचक तथ्यक यह है कि ईएचपी मृदा के माध्यम से भी फैल सकता है जिसकी पुष्टि पीसीआर द्वारा स्वस्थ डीगों को तालाब की मृदा पर 15 दिनों तक एक्पोज करने पर हुई। अन्य प्रणजातों जैसे पॉलीकीट वार्म, ग्रीन मसल और क्लासमस की जांच से ज्ञात हुआ है कि इन जीवजातों की ईएचपी फैलाव में कोई भूमिका नहीं हो सकती है जो पीसीआर परीक्षणों से स्पष्ट है।

सफेद मल के अणुजीव विविधता की जांच

सफेद मल के अणुजीव विविधता सडिरोम (डब्यू. थ एफएस) से प्रभावित डीगा तालाब में नेक्श्ट जेनरेशन सीकवेंसिंग (एनजीएस) से सूचित हुआ है कि स्वस्थ तालाब की तुलना में जीनस स्तर पर कवकीय विविधता में उल्लेखनीय भिन्नता है। केवल डब्यू. थ एफएस प्रभावित तालाब में फंगल जेनेरा जैसे मलाससेजिया, गानोडेरमा मौजूद है। माना जाता है कि मलाससेजिया से मानव एवं पशुओं में त्वेवा संक्रमण होता है। डब्यू. थ एफएस प्रभावित तालाब में कैनडिडा प्रजाति प्रमुख जेनेरा है। इसकी अनेक प्रजातियां प्राकृतिक रूप से रोगजनक हैं।

उन्नत डब्यू. थ एसएसवी नैदानिक कटि

वन स्ट्रेप डब्यूडाम एसएसवी पीसीआर एस्सीस से 5 गुना अधिक संवेदनशील फस्ट ए स्ट्रेप पीसीआर बीइंग 200 कॉपीस/μएल वाले उन्नत डब्यू. थ एसएसवी नेस्टेड पीसीआर डायग्नोस्टिक एस्सेय का विकास किया गया। अन्य नेस्टेड पीसीआर एस्सेस की तुलना में 10 से 50 गुना अधिक संवेदनशील नेस्टेड डब्यू. थ एसएसवी पीसीआर की संवेदनशीलता 2 कॉपीस/μएल है। डब्यू. थ एसएसवी, ईएचपी तथा आईएचएचएनवी के लिए हाई सेंसिटिविजिअल लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्ली न फर्किशन एस्सेय का भी विकास किया गया और इन नैदानिकों

को पाइन्टम ऑफ केर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

वाइब्रियोसिस का जैविक नियंत्रण

डीगा हैचरियों में फेज थेरेपी के उपयोग से वाइब्रियोसिस का जैवनियंत्रण कार्य जारी रखा गया। फेज प्रॉडक्शन प्रोटोकॉल का अनुकूलन किया गया। डीगा हैचरियों में ल्यूमिनीसेंट बैक्टीरियल डिसीस (एलबीडी) आउटब्रेक के दौरान फेज थेरेपी परीक्षण किए गए। चार फेजेस के कंसोर्टियम का उपयोग किया गया। फेज थेरेपी से उपचारित टैंकों में लारवा का औसत अतजीवता पीएल 5 अवस्था तक 36% है जो पीएल 3 अवस्था में अनुपचारित टैंकों में 100% है। इसके अतिरिक्त, वाइब्रियो काउंट में एक लॉग रडिक्शन तथा ल्यूमिनीसेंट बैक्टीरियल काउंट में दो लॉग रडिक्शन थे।

डब्यू. थ एसएसवी की प्रभावकारी नषिक्रियता

जलजीव पालन जैव सुरक्षा में कीटाणु शोधन एक महत्वपूर्ण उपाय है। कृत्रिम डीगा पालन पर्यावरण में डब्यू. थ एसएसवी की प्रभावकारी नषिक्रियता के लिए क्लोरीन उपयोग की अनुकूल मात्रा एवं अवधि प्रभावित डीगा के ऊतकों में दो दिनों में वायरस की नषिक्रियता के लिए 10 पीपीएम, जबकि मृदा में डब्यू. थ एसएसवी की नषिक्रियता 20 पीपीएम क्लोरीन की आवश्यकता है। 42 डीगा प्रक्षेपणों में पालित डीगों का विलेकषण एंटीबायोटिक्स के लिए किया गया जैसे, क्लो. रमफेनिकोल, नाइट्रोफ्लूरोक्स तथा इसकी व्युत्पत्तियां, नाइट्रोफ्लूरोन मेटाबोलाइट, सल्फो नेमाइड्स तथा इसकी व्युत्पत्तियां तथा टेट्रासाइक्लिन अवशेषों से स्पर्ष हुआ है कि केवल चार मृदा नमूने ही सेमिकारबाजाइड के प्रता सकारात्मक हैं।

जलीय पशु रोगों की पीसीआर



नैदानिकी का क्षमता निर्माण एवं सामंजस्यल दर

इस कार्य का मुख्य उद्देश्य देश के पूरवी तट एवं पश्चिमी तट के जलीय कृषिओं के हित के लिए कुशल एवं वंशवृद्धिशील पीसीआर परीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु है, जहां वे अपने नमूनों को वंशवृद्धिशीलता के साथ परीक्षण करा सकें ताकि प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से उपयुक्त नरिण्य ले सकें। प्रथम चरण में प्रयोगशालाओं में उपलब्ध पीसीआर सुविधाओं का सीबा एवं आरजीसीए के एक दल द्वारा नरिण्य के माध्यम से नरिण्य कया गया। इसके बाद सीबा में प्रयोगशाला तकनीकीयों के लिए 03 से 05 अक्टूबर, 2016 के दौरान तीन दृष्टिीय व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन कया गया जसमें न्यू क्लिक एसडि, डब्लू मे एसएसवी, ईएचपी तथा आरएनए वायरस, संक्रामक मायोनैक्रोसिस वायरस के लिए पीसीआर के संधिांत एवं व्यवहार का संधिांतिक एवं अभ्यासात्मक कक्षाएं सम्मलित की गई। झीगा रोग न्यूतक्लिक एसडि एवं पीसीआर के मौलिक तथ्य, झीगा नमूनाकरण के प्रोटोकल, न्यूतक्लिक एसडि के नरिण्यकरण, पीसीआर पर कार्य, इलेक्ट्रो फोरेसिस तथा पीसीआर परिणामों की सूचना के अलावा टर्बल शूटिंग पर एक अध्याय वाले प्रशिक्षण मैनुअल प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान आंध्र प्रदेश (11), तमिलनाडु (8), कर्नाटक (3) तथा गुजरात (3) की कुल 25 प्रयोगशालाओं ने इस पीसीआर रनि परीक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। रनि परीक्षण में भाग लेने वाली 25 प्रयोगशालाओं मंप से 24 प्रयोगशालाओं ने परिणामों को प्रस्तुत कया जनिमें से 17 प्रयोगशालाएं रनि परीक्षण में सफल हुईं।

जलजीव पालन स्वास्थ्या शक्ति

तमिलनाडु के नागपट्टनम जलिके चिन्ना थुम्बूर में 19 अगस्त, 2016 तथा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जलिके में 28 सतिंबर, 2016 को जलजीव पालन स्वास्थ्या शक्ति का आयोजन कया गया। इस प्रदेश के झीगा पालकों के हित में पीसीआर-डीएनए परीक्षण के उपयोग से डब्लू ई एसडी तथा ईएचपी के लिए नरिण्य ऑन-फार्म परीक्षण सेवा उपलब्ध कराई गई। तालाब की मृदा की अवस्था तथा जल गुणवत्ता प्रचल जैसे रडिंकस पोर्टेशियल, पीएच, लवणीयता, कषारीयता, कठोरता आदि जनिमें बैक्टीरियल लोड भी सम्मलित है, जो जलजीव पालन तालाब परतिंर के स्वास्थ्या को सूचित करता है। सूचित करने संबंधी परीक्षण कए गए तथा कृषिओं को उनकी रपिस्ट दी गई उपचारात्मक सुझाव दए गए। डब्लूएस एसडी, ईएचपी, एकसूकट हेपाटोपैक्थियाटिक नक्रोसिस डिसीस (एचपीएनडी) तथा जलजीव पालन के नरिण्य के उचित उपयोग जैसे रोग प्रबंधन वरिण्य पर मातृभाषा में तैयार कए गए वसितावर पत्रकों को झीगा पालकों में वतिरित कया गया। तालाब की मृदा एवं जल गुणवत्ता के बेहतर प्रबंधन के लिए मृदा एवं जल गुणवत्ता प्रबंधन, रडिंकस पोर्टेशियल तथा झीगा पालन में खनिजों के उपयोग वरिण्य पर पत्रक वतिरित कए गए।

पीनीयस वननालमेय के लिए लागत प्रभावी आहार

केरल के त्रिपुर जलिके वोडंगलार गांव के एक कृषि के तालाब में सीबा का देशज लागत प्रभावी आहार वनना मीप्लेस का परीक्षण कया गया। हम ने यह नरिण्य कया है कि वननापमीप्लेस के उपयोग से एक क.ग्रा. झीगा उत्पादन के खर्च को 91 से 98 रुपए तक सीमति कया जा सकता है, जो वाणज्यिक आहार के उपयोग में 140 रुपए तक जा सकता है। यह नरिण्य कया गया है कि क.ग्रा. झीगा उत्पादन में आहार

खर्च को 91 से 98 रुप. तक सीमति कया जा सकता है, जो वाणज्यिक आहार के उपयोग में 140 रुपए तक जा सकता है।

आहार में एक घटक के रूप में राइस ड्राइड डस्टिलरी ग्रेन

पी. वननाममेयी, पी. मोनोडॉन तथा मुगलि सेफालस के आहार में घटक के रूप में राइस ड्राइड डस्टिलरी ग्रेन सोल्यूडबल (डीडीजीएस) की संभावना का परीक्षण कया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ है कि पी. मोनोडॉन तथा मुगलि सफालस के आहार में नरिण्यडन से समझौता कए बिना डीडीजीएस को 10% तक सम्मलित कया जा सकता है। पी. वननाममेयी के आहार में सोयाबीन मील के स्था न पर डीडीजीएस को 10% तक उपयोग कया जा सकता है।

कूमा झीगा, पी. जापोनीकस के लिए वरिण्य आहार

नमिना प्रोटीन (42%) वाले आहार की तुलना में पी. जापोनीकस को दए गए उच्च प्रोटीन (48%) का नरिण्यडन बेहतर देखा गया है, अधिकतम लागत:लाभ अनुपात को प्राप्त करने में नमिना प्रोटीन आहार लागत प्रभावी है।

कवकीय (एसुनरगलिलस नायगर) कणिवशन का प्रभाव

झीगों के दो तैलीय आहार (सूरजमुखी और मूंगफली) में पोषक तत्वों के उपयोग से सूचित हुआ है कि पी. इंडिकस के कवके आहार में 2.5% सम्मलित सीमा के वरिण्य तैलीय आहारों को क्रमशः 7.5% तथा 10% तक बढ़ाया जा सकता है।

केकडों का आहार

केकडों के पालन में सूत्रबद्ध सूत्रे आहार के उपयोग का खेत परीक्षण कया गया, जसके परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है कि परिणामगत ट्रेिश फिश आधारित एकल पालन तथा बहु-प्रजातीय पालन की तुलना में इससे लागत:लाभ आशाजनक पाया गया।

गरे मुल्लूट में फैंटी एसडि की गतविधि

मलिक फशि के मांसपेशियों तथा यकृत में आयु एवं लिंग के संदर्भ में फैंटी एसडि की भिन्नताओं पर किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मादा मछलियों की तुलना में नर मछलियों में प्रारंभिक अवस्था में प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण फैंटी एसडि अधिक होते हैं जसिसे यह सूचित होता है कि नर मछलियों में परिपक्वता शीघ्र होती है। यह भी स्पष्ट है कि आयु के संदर्भ में उतक आधारित भिन्नताएं होती हैं। यह सूचना मुल्लेयट्स की वभिन्न जीवन अवस्थाओं में आवश्यकतक आहार की रूपरेखा के लिए उपयोगी है।

पी. वननाममेय में आवश्यक आहारिय फैंटी एसडि का स्रोत

हाइपर और हाइपो लवणता तनावपूर्ण पर्यावरण में पी. वननाममेय की अंतर्जीवित एवं वृद्धिनिष्पादन में आवश्यकतक फैंटी एसडि के स्रोतों में बदलाव से आहारिय संशोधनों के कारण वृद्धि देसी गई है।

हरति जल स्थितियों में उच्च घनत्व में मलिकआफशि के पोनों का नर्सरी संवर्धन

मलिकजफशि के पोनों के लिए विशेष नर्सरी आहार का विकास किया गया जो मलिकजफशि के अधिकतम वृद्धि संभावनाओं को प्राप्त करने में प्रभावकारी पाया गया। 40 दिनों के संवर्धन काल में लार्वा का शारीरिक भार 2.6 ग्र. प्राप्त हुआ।

परल सूपॉसट के लिए सूक्ष्म आधारित नर्सरी आहार

सूक्ष्मजगत के टैकों में सूक्ष्म आधारित नर्सरी के आहार के उपयोग से परल सूपॉसट की तुरुण मछलियों के गहन नर्सरी संवर्धन में सुधार किया गया। 20 दिनों के डीपीएच पर प्रारंभिक 80 से 100 म.ग्र. पोनों के उपयोग से 40 दिनों के संवर्धन काल में 95% अंतर्जीवित

तथा 0.8 से 1.0 एफसीआर से 1 ग्र. (900 म.ग्र. से 1200 म.ग्र.) तुरुण मछलियों का उत्पादन 1000 पोना/घन मीटर के घनत्व से उत्पादन किया गया।

संग्रहण घनत्व में समृद्ध सूक्ष्मजगत आधारित प्रकृतिक आहार का प्रभाव

सूक्ष्मजगत आधारित प्रकृतिक आहार स्थितियों में वननाममेय डीनों के संग्रहण घनत्व का वृद्धिनिष्पादन पर किए गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि बेहतर आहार उपयोग के लिए अनुकूलतम घनत्व 50 डीना प्रति घन मीटर है।

बायोफ्लॉक मील में न्यू ट्रेट प्रोफाइलिंग

सी:एन अनुपात के संदर्भ में उत्पादित बायोफ्लॉक मील में पोषक तत्वों के प्रोफाइलिंग से स्पष्ट हुआ है कि बायोफ्लॉक एमिनो एसडि मेथियोनाइन का समृद्ध स्रोत है जसि जलीय आहार सूत्रों में एमिनो एसडि को सीमिति करने वाला माना जाता है।

माइस्टस गुलियो के लिए आवश्यक आहारिय प्रोटीन

माइस्टस गुलियो के लिए आवश्यक आहारिय प्रोटीन के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि अधिकतम निष्पादन के लिए 25% कूड प्रोटीन अनुकूलतम होगा। बैकग्राउंड पालन प्रकार में उच्च मूल्य के इस मछली के गहन पालन के लिए कम लागत वाले वस वहारिक आहार जसिमें 25% प्रोटीन तथा 6% लपिडि मौजूद हो, सफिरशि की जाती है।

सूक्ष्मजगत शैवाल की जैवविधित

मुत्तुकाडू पश्च जल में सूक्ष्मजगत शैवाल के विलेपण में पाया गया कि पश्च जल जलीय कृषि में महत्वपूर्ण सूक्ष्मजगत शैवालों के नस्लों से समृद्ध है। इन पश्चमजलों से पहली बार संभावित नस्ल जैसे, आर्थ्रोस्पिरा मैक्सिमा तथा स्पिरिनुला सबसालसा को पृथक किया

गया और इन संपदाओं का रखरखाव किया गया। प्रत्यक्ष आहार के लिए लाइव फीड को समृद्ध करने के लिए इन संसाधनों को लाइव फीड के रूप में बेहतर उपयोग करने हेतु न्यू ट्रेट प्रोफाइलिंग तथा मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी अध्ययनों का प्रयास किया गया।

परल सूपॉसट का आनुवांशिक गुणवत्ति

वभिन्नपस्था नों (पुलिकिट डील : तमलिनाडु; वेल्वारयनी, वेम्बाकनड तथा अस्था मुडी : केरल) के परल सूपॉसट समष्टियों इट्रोप्ल:स सुराटेंसिस का माइटोकोण्ड्रियल डीएनए ATPase 6/8 के उपयोग से आनुवांशिक गुणवत्ति किया गया। वेल्वारयनी, वेम्बाकनड तथा अस्थाडमुडी डीलों से पुलिकिट डील की समष्टि पूर्णतः भिन्न पाई गई।

पीनीयस इंडिकस की आनुवांशिक संपदा

इंडियन वहाकडट श्रृंखला पीनीयस इंडिकस : 1) पश्चिम बंगाल, 2) ओडिशा, तमलिनाडु एवं केरल तथा 3) महाराष्ट्र के तीन भिन्ना आनुवांशिक संपदाओं को माइटोकोण्ड्रियल डीएनए जीन, 16S rRNA के आधार पर प्रलेखित किया गया।

पीनीयस वननाममेय का ट्रांसक्रिप्टोमि प्रोफाइलिंग

तापमान दबाव वाले पी. वननाममेय तुरुण डीनों के ट्रांसक्रिप्टोमि प्रोफाइलिंग के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 290 से. पर रखरखाव किए गए डीनों की तुलना में उच्च तापमान (31 एवं 330 से.) वाली डीनों की तुरुण मछलियों ने फैंटी एसडि बायोसिथिसिस में सम्मिलित ट्रांसक्रिप्टोमि की उच्च अभिव्यक्ति दर्शाई है।

पीनीयस जीनस का मॉल्यूलर फाइलोजेनेटिक विलेखण

संपूर्ण माइटोकोण्ड्रियल जीनोम के



उपयोग से पीनीयस सेंसुलाटो जीनस की झींगा प्रजातियों में आकलन फाइलोजेनेटिक संबंध, पेरेज फरफेंटे तथा केनसेली (1997) द्वारा प्रस्तावित इस जीनस के 6 अलग जेनेराओं में वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है।

सीबा की प्रौद्योगिकियों तथा नीतिगत हस्तक्षेपों के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण

तीन वयनति जलजीव पालन प्रौद्योगिकियों, नामतः डब्ल्यूएसएसवी कटि (2002-2009), पीनीयस वनोमेय का परचियन (2009-2016) तथा सीबास्टमि उत्पादन (2012-2016) के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। इन प्रौद्योगिकियों से 2002 से 2016 के दौरान राष्ट्रीय राजकोष को प्राप्त कुल आर्थिक लाभ 34,413 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है।

मेरा गांव मेरा गौरव (एमजीएमजी) कार्यक्रम

सनजीयाममन, तस्मितायनम तथा कनवनतुराड, अप्रवीक्कम्, तस्मितायनम

र जलों के जनजातीय तथा तटीय क्षेत्रों में कुल 10 बैठकों तथा जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया। कविन गार्डन, पोषणकिता एवं स्वच्छता, समूह गठन, प्रौद्योगिकियों का नमूना एवं अपनाना, कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने के दौरान समस्याओं का समाधान जैसे हस्तक्षेपों पर लाभार्थियों के हितों के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

झींगा पालन प्रणालियों की सततता का अध्ययन

केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में झींगा पालन की सततता का अध्ययन किया गया। झींगा पालन प्रणालियों की सततता के आकलन के लिए वसिंता मेथडोलॉजी के आधार पर कुल 28 सूचकों की पहचान की गई। अध्ययनों के परिणामों से स्पष्ट हुआ है कि झींगा पालन का औसत सततता सूचकांक 0.74 है। जबकि अर्द्ध-गहन तथा परंपरागत झींगा पालन का सततता सूचकांक क्रमशः

0.79 तथा 0.65 है। परिणामों से सूचित हुआ है कि परंपरागत प्रणालियों की तुलना में अर्द्ध-गहन पालन प्रणाली सापेक्षिक रूप से बेहतर है।

आईसीएआर-सीबा द्वारा वनोमेय मीश्रपिप का प्रारंभ

सीबा ने झींगा पालन से संबंधित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, बाजारों तथा नीतियों से संबंधित तकनीकी सूचनाओं को पणधारियों तक नरितर पूछे जाने वाले पश्चोत्तर के रूप में एक इंटरैक्टिव आधारित मोबाइल एप 'वनोमेय मीश्रपिप' का प्रारंभ किया है। इस मोबाइल एप को नःशुल्क गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।